j'ai été chargé par l'académie de faire mon rapport sur la lettre qui lui à été envoyée par M.r Berte M.tre en chirurgie à dans la quelle l'auteur demande des conseils sur la conduite quil a à tenir, pour traiter une maladie chirurgicale, qui demande de la part du chirurgien, la plus grande circonspection.

une fille agée de vingt à vingt un an, porte depuis trois un Goêtre du volume d'un pain de deux livres, qui s'étend depuis la region mastoïdyene, et la base de la machoire inferieure, jusques à la clavicule. cette tumeur à paru qu'à l'époque où cette fille devoit être naturellement reglée, et a acquis plus de volume lorsque cet écoulement diminuoit, ou cessoit entierement. l'auteur en demandant les conseils de l'academie, donne le projet de l'extirper, sans faire mention si l'on a employé auparavant des remedes, ou si l'on n'en a pas employé.

ARC 30 d.4 n° 87
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je voudrois dit-il, dans cette opération Respecter La tiroyde, à cause des vaisseaux considerable, qui la pénétrent. l'on voit par là qu'il ignore Entiérement le Siége de la maladie pour la quelle il veut opérer.
je crois que l'académie Rendra un grand Service à la malade, en prescrivant à ce chirurgien, un traitement plus methodique.
je vais tracer en peu de mots, celui que je crois être le plus convenable, en Supposant cependant à l'auteur, assez de Sagacité pour faire un choix convenable, et pour Employer chacun des remedes, suivant le temps, et les circonstances qui accompagneront la maladie.
les vuës du chirurgien doivent tendre à rappeller S'il est possible, l'écoulement des regles par l'usage des remedes géneraux, et des emménagogues pris intérieurement. les Saignées, Surtout celles du pied, proportionées aux forces et au tempérament de la malade, faites à l'approche du temps où les menstrues doivent paroître. l'état actuel de la tumeur, doit déterminer le chirurgien sur le choix des topiques qu'il doit mettre en usage. l'on a Employé avec Succès l'application du Sel marin et du Sel ammoniac, la cendre de liége, les morceaux d'éponge trempés dans la lessive de Sarment, renfermés dans un collier de toile doublé de taffetas noir,

Ces moyens bien administrés ~~~~ avec un regime convenable ont Suffi quelquefois, Suivant le temoignage de Mr petit, pour guérir de Semblables maladies, Surtout lorsquelles avoient pour cause principale la cessation des menstrues,

Mr. heoin proff. donne dans son ouvrage la formule d'un remede contre cette maladie, Employé à Sainte marie auxmines où cette maladie est fréquente. ℞ huit onces de fèves noires, quatre onces de Sucre candi, Six onces d'éponge faites torréfier le tout dans un pot vernissé et fermé, reduisezle ensuite en poudre, dont on donnera un gros, matin et Soir.

Si malgré l'usage de tous ces moyens, la tumeur ne diminue point, quelle semble vouloir prendre la voie de la Suppuration, il faut Seconder les vuës de la nature pour cette terminaison, par l'application des Emollients, lorsque toutes les duretés Seront bien fondues, que la ~~Suppuration~~ fluctuation Sera bien ~~établie~~ manifeste l'on en fera l'ouverture avec un trocar pour faire Sortir le liquide contenu, Mr. petit a pratiqué plusieursfois et avec Succès cette opération.

le traitement que je viens de prescrire est très long, et demande de la part de la malade, et du chirurgien, la plus grande constance; mais quand il S'agit de la cure d'une maladie aussi grave, l'on ne Sauroit trop en avoir. Enfin Si tous ces moyens prudemment ~~[illegible]~~ administrés ne produisent pas l'effet desiré, ils disposeront du-moins la malade, à l'opération quil convient

d'employer alors; et voici celle que je crois Etre la plus convenable. la malade Située convenablement, Soutenue par des aydes, l'opérateur ~~placé devant la malade~~ ~~convenablement~~ fera avec un Bistouri bien tranchant, une incision sur le milieu de la tumeur, qui S'étendra depuis la partie Superieure, jusques à l'inferieure; l'on en fera une Seconde S'il est necessaire, qui coupe celle-ci En angle droit, du coté où la tumeur est plus Saillante; la peau bien disequée de chaque coté, et le Kiste à decouvert, le chirurgien passera du haut en bas, à la base de la tumeur une Eguille à Seton pointue, et un peu recourbée, enfilée d'un ruban de fil ciré formé de six brins; le ruban passé l'on Séparera les brins de chaque coté de la tumeur, et on les nouera par le nœud ~~simple~~ du chirurgien; l'on Serrera d'abord mediocrement, puis le lendemain l'on Serrera davantage, ainsi de Suite jusques-à-ce que la tumeur Soit tombée en mortification, ce qui arrive ordinairement au bout de trois ou quatre jours.

cette opération a Eu les plus Grands Succès Entre les mains de feu M.r foubert, dans un cas où la tumeur occupant les mêmes parties, avoit un volume bien plus considérable; la peau qui la couvroit fut comprise par la ligature, mais ici cette partie étant Saine et non adherente à la tumeur. je crois qu'il est plus à propos de la conserver.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ce 16 août 1787

Roux